



- Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i przyspieszonym biciem serca HR > 80 u/min



- Pacjenci z nadciśnieniem tętniczym i współistniejącymi chorobami serca:



choroba wieńcowa



niewydolność serca



■ Pacjenci z chorobą wieńcową



- Pacjenci z niewydolnością serca

[illegible]

Dwie drogi, jeden cel...

...życie!

Nadawanie:

- 1. Dotyczy Nibepes 5 mg tabletki, Bisocard 5 mg tabletki powlekane i Bisocard 10 mg tabletki powlekane.
- 2. Dotyczy Bisocard 5 mg tabletki powlekane i Bisocard 10 mg tabletki powlekane.
- 3. Dotyczy Bisoprololu 5 mg tabletki, Bisocard 2,5 mg tabletki powlekane, Bisocard 5 mg tabletki powlekane i Bisocard 10 mg tabletki powlekane.
- 4. Huang C. 6-month consequences of COVID-19 in patients discharged from hospital: a cohort study. *Lancet*. 2021; 397: 220-232.
- 5. Saad S. Coronavirus Disease 2019 and cardiovascular complications: focused clinical review. *J Hypertens*. 2021; 39: 1282-1292.
- 6. Ustęła dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Bisocard 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, kapsułki twarde. Data ostatniej aktualizacji ustęły: Styczeń 2021.
- 7. Dane IQWiA 02/2022.
- 8. Filipiak K. J. Poczynoczenie beta-adrenolityków w 2022 roku, sesja satelitarna w trakcie konferencji „Repetitorium z kardiologii” w dniu 05.03.2022 r.
- 9. Doroszcak A. et al. Nebiwelol w terapii nadciśnienia tętniczego (chłodzi towarzyszących): Nadciśnienie tętnicze / 01/2022.
- 10. Wąkulska-Kaplan B. et al. Nebiwelol okiem kardiologa hipertensjologicznego. *Folia Cardiologica* 2014; tom 9, nr. 2: 165-171.
- 11. Mitrega K. et al. Nebiwelol – najładniejszy kardiolektyny β-adrenolityczny / Kardiologia w 27 sierpnia 2021.
- 12. Pacjent post-COVID-19. Co zostaje, a co się zmienia? pod redakcją Marci Maślińskiej; Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Ekrony Reicher Warszawa 2021; wydanie I.
- 13. Dobrowolski P., Prejzma J., Januszewska A. β-adrenolityki w terapii nadciśnienia tętniczego – optymalny wybór w rekomendacjach klinicznych, *Terapia* (4/01) (2021).

^{***} Zarejestrowane wskazanie dla leku Bioscord 5 mg tabletki powłoknej i 10 mg tabletki powłoknej zgodnie z ChPL – stabiliza, pierwsz.


BISOCARD®

Bisoprololi fumaras

jakość potwierdzona skutecznością



Tachykardia może dotyczyć nawet **50% pacjentów**, którzy przebyli infekcję SARS-CoV-2



U **25%-50%** pacjentów tachykardia utrzymuje się 12 tygodni lub dłużej




Po 6 miesiącach: **9%** pacjentów

Częstość występowania tachykardii u pacjentów post-COVID⁴

Wybrane, możliwe następstwa COVID-19⁵

utrzymujące się podwyższone tętno spoczynkowe



utrzymujące się podwyższone ciśnienie krwi



uszkodzenie nerek



słaba kontrola glikemii




BISOCARD®

Bisoprololi fumaras

WYTWARZANY W POLSCE⁶




Duży efekt redukcji HR
Kontrola HR w obrębie migotania przedsionków⁸



Optymalna częstość akcji serca⁹

NEBISPES


nebiwolol



■ wykazuje podwójne działanie wazodylatacyjne (wzrost biodostępności tlenu azotu, agonistyczny efekt na receptor β_3 -adrenergiczny) i antyoksydacyjne^{9,10}



■ uwolnienie NO i redukcja stresu oksydacyjnego bezpośrednio wiążą się z poprawą metabolizmu lipidów i glukozy¹¹



■ poprawia funkcję śródbłonna⁹, którego uszkodzenie (np. na skutek przebytego zakażenia SARS-COV-2) zwiększa ryzyko powikłań zakrzepowo-zatorowych¹²

Wybierasz **nebiwolol**, sięgnij po

NEBISPES

nebiwolol

spes – nadzieja

opracowany na bazie najlepszych doświadczeń z lekiem **BISOCARD®**

